HOJA INFORMATIVA: Eritema Infecciosa (Parvovirus B19)

La enfermedad de Eritema Infecciosa ocurre con mayor frecuencia en niños pequeños. Para la mayoría de las personas, esta es una infección autolimitada que solo requiere atención de apoyo y se resuelve en 2 a 10 días. Algunas personas nunca desarrollan síntomas.

La enfermedad de Eritema Infecciosa (parvovirus B19) se transmite por:

- Gotitas o secreciones respiratorias
- Tos y estornudos
- Sangre o hemoderivados

Por favor monitorea a su hijo/a para detectar los siguientes síntomas durante 7 a 21 días:

Fiebre	Dolor de cabeza
Rinorrea	Erupción: generalmente leve, puede ocurrir una apariencia de "mejilla abofeteada"

Si su hijo/a desarrolla algún síntoma, manténgalo en casa y llame a su proveedor de atención médica.

Prevención:

- Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos o gel de manos a base de alcohol
- No tocarse los ojos, la nariz y la boca tanto como sea posible.
- Evita a las personas que están infectadas.

Individuos en alto riesgo:

Siempre consulte con su proveedor de atención médica si tiene alguna pregunta o inquietud. Una mujer embarazada que está infectada con el parvovirus B19 puede transmitirle el virus a su bebé. Cualquier mujer embarazada o persona con compromiso del sistema inmunitario que pueda haber estado expuesta a la enfermedad de Eritema Infecciosa (parvovirus B19) debe comunicarse con su obstetra o proveedor de atención médica lo antes posible.

Volver a la escuela:

Se necesitará una carta de autorización para regresar a la escuela y la erupción y los síntomas deben resolverse sin fiebre durante 24 horas.

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico o llame a la enfermera de su escuela (que se encuentra en el sitio web de su escuela local).

Para más información: https://www.cdc.gov/parvovirusb19/index.html