



## HOJA INFORMATIVA: Faringitis Estreptocócica

La faringitis estreptocócica (causada por el estreptococo del grupo A) es una infección de garganta común entre los niños y los síntomas generalmente progresan rápidamente.

### La faringitis estreptocócica se transmite por:

- Secreciones respiratorias, gotitas
- Contacto directo con secreciones respiratorias y luego se toca la boca o la nariz.
- Comparte vasos, comida, botellas de agua, etc.

### Controle a su hijo/a para detectar los siguientes síntomas durante los próximos 2 a 5 días:

Fiebre	Ganglios linfáticos del cuello inflamados
Dolor de garganta: amígdalas rojas e hinchadas	Dolor de estómago
Diminutas manchas rojas en el techo de la boca (petequias)	Náuseas y vómitos
Dificultad para tragar	Dolor de Cabeza

***Si su hijo/a desarrolla algún síntoma, manténgalo en casa y llame a su proveedor de atención médica.***

### Prevención:

- Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante 20 segundos o desinfectante a base de alcohol
- Evita a las personas que están enfermas.
- No comparta vasos, comida, botellas de agua, etc.

### Individuos en alto riesgo:

Siempre consulte con su proveedor de atención médica si tiene alguna pregunta o inquietud. Aunque las complicaciones graves son raras, algunos factores aumentan el riesgo de una persona. Cualquier persona con condiciones subyacentes, sistema inmunológico comprometido, embarazo, ancianos, etc. debe comunicarse con su proveedor de atención médica si ha estado expuesto y tiene preguntas.

### Volver al colegio:

Se necesita una carta de autorización para regresar a la escuela. Si hay varios casos en el salón de clases o una enfermedad de moderada a grave, un estudiante puede regresar 24 horas después de haber recibido antibióticos.

**Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico o llame a la enfermera de su escuela (que se encuentra en el sitio web de su escuela local)**

Para más información: <https://www.cdc.gov/groupastrep/diseases-public/strep-throat.html>